

御纂醫宗金鑑卷六十六

編輯外科心法要訣目錄

舌部

紫舌脹

痰包

舌腫

重舌

痰核

重腭

舌疔

舌疳

附瘰癧風

緊喉風

附酒毒喉閉

慢喉風

喉閉

附酒毒喉閉

啞瘡喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癰

上腭癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

膻中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

蠹疽

瘰癧疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳勞

乳岩

御纂醫宗金鑑卷六十六

編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌腫滿口宜鍼刺血色紫重色紅輕

註

此證由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬疼痛宜用衣鍼紫筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫水漱口搽冰硼散內用涼膈散去朴消大黃加牛蒡子荊芥倍用梔子服之甚效

冰硼散

見口部
驚口瘡

涼膈散

見面部
面發毒

痰包

痰包每在舌下生結腫綿軟似匏形痛脹舌下妨食語火稽痰涎流注成

註

此證生於舌下結腫如匏光軟如綿塞脹舌下有妨飲食

言語色黃木痛由火稽痰涎流注而成宜用立剪當包上

剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷拭淨搽冰硼散服無味

二陳湯忌煎炒火酒等物

加味二陳湯

陳皮

半夏製

白茯苓

黃芩 各八分

黃連

薄荷

甘草 各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

方歌加味二陳療痰包結腫舌下形如匏二陳湯加芩連薄荷

煎服下自然消

冰硼散 見口部

舌腫

舌腫心火血分炎舌上生孔似鐵尖或如筋頭其色紫甚黑腐

爛血出泉

此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升麻湯兼搽必勝散甚效

升麻湯

升麻

小薊根

黃根 各一兩五錢

艾葉

七錢五分

寒水石

三兩

研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地黃汁一羹匙再煎二滾服或加炒側柏葉五錢亦可

方歌升麻舌衄心火炎小薊薊根各兩半艾葉七錢五分加寒

水三兩同煎

必勝散

螺青

另研

蒲黃

各一錢
炒

共合一處研細搽於患處後用溫鹽湯漱口

方必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研末蒲黃炒同

勻搽之白歸經

重舌 痰核 重腭 舌疔

舌證發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血脈脹痰核舌
上一核生重腭生於口上腭時心煩梅子形舌疔舌上生紫
炮其形如豆寒熱增

註此證無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾蘊熱循經

上冲舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀故名重舌宜用
冰硼散搽之痰核者心脾痰涎鬱熱舌上生核強硬作痛
宜用衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯重勝者心脾
有熱以致上腭生瘡形如梅子外無寒熱內時作煩此屬
熱極禁用鍼刺宜服黃連解毒湯加桔梗不時用紫雪散
噙化舌疔者心脾火毒舌生紫炮其形如豆堅硬寒熱疼
痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨嚥或再服三
粒以解內毒甚者刺之服黃連解毒湯兼搽紫雪散及徐
嚥之即愈

紫雪散

犀角

鎊

羚羊角

鎊

石膏

寒水石

升麻

各一兩

元參 二兩

甘草

生 八錢

沉香

剉

木香

各五錢

水五盞煎藥剉湯一盞將渣用絹瀝去將湯再煎滾投提
 淨朴消三兩六錢文火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入
 盞內下硃砂冰片各三錢金箔一百張各預研細和勻將
 藥盞安入涼水盆中候冷凝如雪為度大人每用一錢小
 兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效或用淡竹葉燈心煎
 湯化服亦可咽喉腫痛等證吹之亦效

方歌

紫雪散腎積熱效沉木犀
 羚羊元參草寒水升膏朴消加硃

鉛水餅入內攪

冰硼散

見口部
驚口瘡

加味二陳湯

見喉包

黃連解毒湯

見耳部
黑疔

蟾酥丸

見疔瘡門

舌疳

附瘰癧風

舌疳心脾毒火成如豆如菌痛爛紅漸若泛蓮難飲食綿潰久

發原瘰癧風

此證由心脾毒火所致其證最惡初如豆次如菌頭大蒂

小又名舌疳發痛紅爛無皮明輕者重急用乳庭丹點之

自然消縮而愈若失於調治以致喉腫突如泛蓮或有狀如雞冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津臭涎再因怒氣上冲怒然崩裂血出不止久久延及項頷腫如結核堅硬髀痛皮色如常頂輒一點色暗木紅破後時津臭水腐如爛棉其證雖破堅硬腫痛仍前不退此爲綿潰甚至透舌穿腮湯水漏出是以又名瘰癧風也蓋舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱鬱甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風咽喉常腫湯水不能下嚥此證咽喉不腫可以下嚥湯水胃中亦思飲食因舌不能轉動迭送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而

怯證悉添日漸衰敗初起宜服導赤湯加黃連虛者服歸脾湯熱甚者服清涼甘露飲合歸脾湯便瘡者服歸芍異功湯領下腫核初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之潰後宜水澄膏貼之自古治法雖多然此證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已

清溪秘傳北庭丹

番礪砂

人中白

各五分

瓦上青苔

瓦松

澹雞矢

各一錢

用傾銀罐子二箇將藥裝在罐內將口封嚴外用鹽泥封固以炭火煨紅待三炷香爲度候冷開罐將藥取出入磨

香冰片各一分共研細末用磁鉢刺破舌面用丹少許點上再以蒲黃蓋之

方歌北庭丹點舌面生瓦松澹雞矢人中瓦上青苔番礪末罐

封火煨入麝冰

歸芍異功湯

人參

白朮土炒

廣陳皮

白芍

酒炒

當歸身

各一錢

白茯苓

二錢

甘草

五分炙

燈心五十寸水煎空心服

方歌歸芍異功扶脾氣健胃又能止瀉利四君歸芍廣陳皮引

加燈心是良劑

水澄膏

硃砂

二錢
水飛

白及

白欬

五倍子

鬱金

各一兩

雄黃

乳香

各五錢

存為細末米醋調濃以厚紙攤貼之

方歌

水澄膏貼消核驗水飛硃砂末二錢及欬鬱金雄黃乳五

倍同研用醋

調

導赤湯

見口部

歸脾湯

見口部

清涼甘露飲

見口部

喉部

緊喉風

附纏喉風

緊喉膏梁風火成咽喉腫痛難出聲聲如拽鋸緊壅塞穴刺少商吐下功

註

此證由膏梁厚味太過致肺胃積熱復受邪風風熱相搏上壅咽喉腫痛聲音難出湯水不下痰涎壅塞之聲頗似拽鋸初發暴速急刺手大指內側少商穴出紫黑血以瀉其熱痰盛者以桐油錢導吐之吐痰後隨用甘草湯漱之以解桐油之氣內服雄黃解毒丸吐下之喉中吹白降雪散俟關開之後內宜服清咽利膈湯按法調治隨手應效

者順若面青唇黑鼻流冷涕者逆若兼項外遠腫卽名纏喉風其治法雖與此證相同然終屬險惡難治

桐油餞

溫水半盞加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸油探入喉內燃之連探四五次其痰壅出再探再吐以人醒聲高爲度

方歌桐油餞法導痰壅一切喉風用最靈半盞溫水桐油入雞

翎蘸探吐喉通

雄黃解毒丸

雄黃 一兩

鬱金 一錢

巴豆 十四粒
去皮油

共研末醋糊爲丸如黍粒大每服五分津液送下

方雄黃解毒緊喉風開關通閉火能平巴豆去油鬱金末醋

糊丸黍粒形

白降雪散

石膏一錢五分

硼砂一錢

焰消

膽礬各五分

元明粉三分

冰片二分

共研極細末以筆管吹入喉內

方歌白降雪散喉風證腫痛聲難風火凝煨石膏與膽礬末焰

消硼片共元明

清咽利膈湯

牛蒡子

炒研

連翹

去心

荆芥

防風

梔子

生研

桔梗

元參

黃連

金銀花

黃芩

薄荷

甘草

各一錢

大黃

朴消

各一錢

水二鍾淡竹葉二錢煎八分食遠服

方清咽利膈喉痛消疎風清熱勞連翹荆防梔桔參連草銀

花芩薄荷大黃消

慢喉風

慢喉發經體虛生微腫咽乾色淡紅或由暴怒五辛火或因憂

思過度成

此證有因平素體虛更兼暴怒或過食五辛而生者亦有
憂思太過而成者俱屬體虛病實其發緩其色淡其腫微
其咽乾舌見滑白胎大便自利六脈微細脣如蠶色若午
前痛者服補中益氣湯加以清涼如麥冬黑參桔梗牛蒡
子服之若午後作痛作渴身熱足冷者陰陽兩虛也忌用
苦寒宜少陰甘桔湯以宣達之若面赤咽乾不渴者其脈
必虛大以甘露飲服之必效俱兼用冰硼散一錢加燈草
煨灰存性三分吹之立驗

甘露飲

天冬

去心

麥冬

去心

黃芩

生地

熟地

枇杷葉

蜜炙

石斛

枳殼

麩炒

茵陳蒿

甘草

各等分

水二鍾煎八分食後服

方歌

甘露飲清內熱侵面赤咽乾生津液天麥冬苓生熟地枇

杷斛草枳茵陳

補中益氣湯

見消瘍門

少陰甘桔湯

見口部口糜

冰硼散

見口部驚口瘡

喉閉

附酒毒喉閉

喉閉肝肺火盛由風寒相搏腫咽喉甚則腫痛連項外又有酒毒當細求

註

此證由肝肺火盛復受風寒相搏而成咽喉腫痛面赤腮腫甚則項外漫腫喉中有塊如拳湯水難咽語言不出暴起身發寒熱急刺少商穴或鍼合谷穴以開咽喉初宜疎散服荊防敗毒散寒熱已退卽用清咽利膈湯兼吹紫雪散隨以薑汁漱口以宣其熱或用醋漱以消積血痰壅塞者桐油饒探吐痰涎若腫發於項外濃脹痛者防透咽喉不可輕鍼急用皂角末吹鼻取嚏其腫卽破或兼用皂角末醋調厚敷項腫須臾卽破初腫時用生羊肉片貼之喉

閉聲嘶者肺氣將絕急宜獨參湯救之若不然如啞吞吐
不利係寒氣客於會厭也宜蜜炙附子厚合之勿噍初終
忌用苦寒之藥恐難消難潰又有酒毒喉閉由酒毒蒸於
心脾二經熱壅咽喉腫色黃其人面赤目睛上視以樹
油餞導吐痰涎宜服鼠黏子解毒湯亦用紫雪散吹之

鼠黏子解毒湯

鼠黏子

炒研

桔梗

青皮

升麻

黃芩

花粉

甘草

生

元參

梔子

生研

黃連

連翹

去心

葛根

白朮

土炒

防風

生地

水煎食後服

方歌 鼠黏解毒酒毒閉桔梗青皮能降氣升芩花粉草元參梔

連翹葛朮防地

荆防敗毒散

見項部腦疽

清利利腦湯

桐油散

俱見緊喉風

紫雪散

見舌部重舌

獨參湯

見潰瘍門

啞瘡喉風

啞瘡喉風腫痛咽牙關緊急不能言風痰湧塞咽膈上火盛生
痰風據源

註

此證頗類緊喉由肺胃蘊熱積久生痰外復受風邪與痰
熱相搏壅塞咽膈之上而成斯疾初起咽喉腫塞疼痛湯
水難嚥語言不出牙關緊急此屬險候急用雄黃解毒丸
水化用細竹管將藥水吹入鼻孔直達咽喉藥入作嘔卽
令患者吐之其牙關頓鬆咽喉卽稍開通先與米飲飲之
次服清咽利膈湯兼吹水硼散用藥不應者險若唇黑鼻
流冷涕者逆

雄黃解毒丸

清咽利膈湯

俱見喉風

冰硼散

見口部驚口瘡

弄舌喉風

弄舌喉風心脾經實火外寒凝滯成舌出攪動因脹悶咽喉作腫更兼疼

註

此證由心脾實火與外寒鬱遏凝滯而成咽喉腫痛痰涎壅塞音啞言澀舌出不縮時時攪動覺舌脹悶常欲以手捫之故名弄舌急刺少商穴穴在兩手大指裏側去指甲角旁韭葉寬卽是用三稜鍼刺之有血者生無血者死噲蟾酥丸徐嚙藥汁若痰涎上湧不能嚙藥者急用桐油燄

探吐痰涎隨服清咽利膈湯吹金鎖匙於喉內如松子及
魚鱗狀不堵塞者此屬虛陽上浮急用蜜炙附子片噙嚥
其汁卽效

金鎖匙

冰片 二分五厘

白蠟 一錢

雄黃 二錢

焰消 一兩五錢

硼砂 五錢

各研末共勻以雞管吹入喉內腫痛處

方歌 金鎖匙吹弄舌風心脾火鬱外寒乘消痰逐熱除疼痛水

片 蠟 雄 焰 硼

蟾酥丸 見片瘡門

桐油餞

清咽利膈湯

俱見緊喉風

喉疳

喉疳初覺陰虛成噤乾刺痛色淡紅腎火炎上金受尅破爛失音臭腐疼

註

此證一名陰虛喉疳初覺咽噤乾燥如毛草常刺喉中又如硬物隘於咽下嘔吐酸水噦出甜涎淡紅微腫微痛日久其色紫暗不鮮類似凍糯米色由腎液久虧相火炎上消燥肺金薰燎咽喉腫痛日增破爛腐衣疊若蝦皮聲音嘶痛喘急多痰鼻腐蝕延其疼倍增妨礙飲食胃氣由此

漸衰而虛火益盛煩躁者宜服知藥地黃湯若吐酸噦涎
者宜服甘露飲加川黃連便躁者兼服萬氏潤燥膏面脣
俱白不寐懶食者宜歸脾湯加酒炒川黃連廬吹紫雪散
腐吹八寶珍珠散其證投方應病或者十全一二否則難
救

萬氏潤燥膏

豬脂一觔切碎煉油去渣加煉過白蜂蜜一觔攪勻候凝挑
服二匙日用三五次

方歌萬氏潤燥膏神驗降火清金滋便乾豬脂煉油加白蜜挑

服失音也能痊

八寶珍珠散

兒茶

川連末

川貝母

去心研

青黛

各一錢五分

紅褐

燒灰存性

官粉

黃蘗末

魚腦石

微煨

琥珀末

各一錢

人中白

二錢煨

硼砂

八分

冰片

六分

京牛黃

珍珠

各五分豆腐內煮半炷香時取出研末

麝香

三分

各研極細末共兌一處再研勻以細筆管吹入喉內爛肉

處

方入寶珍珠喉疳腐水疳兒茶連貝母紅褐官粉黛牛黃腦

石中白藥

知藥地黃湯

即六味地黃丸加知母黃蘗見面部雀斑

甘露飲

見慢喉風

歸脾湯

見乳部乳中結核

喉癰

喉癰咽乾生苔鮮初癢時增燥裂疼過飲藥酒五辛火微爛延

開蟻蛙形

註

此證一名天白蟻咽隘乾燥初覺時癢久生苔鮮色暗木

紅燥裂疼痛時吐臭涎外癢飲食由過食炙燂藥酒五辛

等物以致熱毒於胃火蒸肺而成斯疾宜服廣筆鼠粘

湯未清吹藥精效已潰吹清涼散患者清心寡慾戒厚味
發物或香十全一二若失治兼調理不謹致生微爛延漫
開大叠起腐衣旁生小孔若蟻蛀蝕之狀多致不救

腐爛鼠黏湯

生肌黃

浙貝母

各三錢
去心研

元參

甘草

各二錢五分
生

鼠黏子

酒炒研

花粉

射干

連翹

各二錢
去心

白芷

炒研

苦竹葉二十片水二鍾煎八分飢時服

方廣筆鼠黏喉癰乾初癢生苔裂痛添生地元參花粉貝連

翹射干白芷

清溪秘傳礬精散

白礬

不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅洒水於磚上將礬末布於磚上以磁盤覆蓋四面灰攤一日夜礬飛盤

上掃下用二錢

白霜梅

二箇去核

真明雄黃

穿山甲

各一錢炙

共研細末以細筆管吹入喉內

方礬精散用火燒磚水濕布礬上覆盤掃霜再兌雄梅甲研

水吹喉癰自痊

清涼散

明砂

三錢

人中白

二錢

黃連末

一錢

南海荷

六分

冰片

五分

青黛

四分

共研極細末吹入喉癰腐處

方歌 清涼散吹天白蟻胃火蒸金成此疾薄黛冰礪中白連腐裂疼痛皆可去

上腭癰

上腭癰若葡萄形少陰三焦積熱成舌難伸縮鼻紅涕口難開合寒熱增

註

此證又名懸癰生於口中上腭由心腎經與三焦經積熱而成形若紫葡萄舌難伸縮口難開合鼻中時出紅涕令人寒熱大作宜黃連消毒飲加桔梗元參服之兼吹冰礪散或日久腫硬下垂不潰者以燒鹽散日點三五次兼服

石鍾乳 各一分

射干九過時失治飲食不入煩躁神昏者逆

燒鹽散

食鹽

火燒

祐白礬

各等分

二味研細以飭頭蘸點患上

方歌燒鹽散治上腭癰懸似葡萄色紫形枯礬燒鹽等分末筋

頭蘸點消熱壅

射干九

射干

川升麻

杏仁

去皮尖麩炒

甘草

各五錢炙

木藿子

川大黃

各二錢炒

右研細末煉蜜和丸如小彈子大每用一丸口中含化徐

頤

方歌射于九竅懸壅思熱聚成形口開難大黃升草木驚否道

九彈狀口中含

黃連消毒飲 見頭部百會疽

冰硼散 見口部鴛口瘡

續喉毒

頸喉毒生因積熱外感風寒耳前結外似瘰癧漸攻喉心與小

腸熱會穴

此證由心與小腸積熱外感風寒凝結而成初生於耳前

熱會穴形如瘰癧漸攻咽喉腫塞疼痛妨礙飲食證須速

即治者治法
心六十六
醫外科心法要訣

七

治宜服牛黃清心丸開關解熱兼服清咽利膈湯吹米

散投方應效方能成功

牛黃清心丸

九轉膽星 一兩

雄黃

黃連末 各二錢

茯神

元參

天竺黃

五倍子 末

荆芥

防風

桔梗

犀角末

當歸 各一錢

木片

麝香

珍珠 各五分
豆腐魚

京牛黃

輕粉 二分

各研極細共和一處再研勻汁草熬膏和丸如龍眼大珠

砂為衣日中曬乾收入磁瓶內將瓶口堵嚴勿令山氣

服時一丸薄荷湯磨服

方牛黃清心鎖喉辟疫輕冰麝參雄竺珍倍荆防枯膽星犀

角諸逆熱退速

清心利膈湯

見紫喉風

冰側散

見口部驚口瘡

乳蛾

乳蛾肺經積火成雙輕單重喉旁生狀若蠶蛾紅腫痛關前易

治開後因

計此證由肺經積熱受風凝結而成生咽喉之旁狀如蠶蛾

即

醫科室要

大

亦有形若瘰癧者紅腫疼痛有單有雙雙者輕單者重生
於關前者形色易見吹藥易到手法易施故易治生於關
後者難見形色吹藥不到手法難施故難治俱宜照清熱
利膈湯吹冰礪散易見者膿熟就之難見者用雞翎探吐
膿血若兼痰塞氣急聲小探吐不出者急用三棱鍼刺
少商穴出血黑血仍吹服前藥緩緩取效

清咽利膈湯 見緊喉風

冰礪散 見口部驚口瘡

喉痛

喉痛鬱熱屬肺經多語損氣相兼成形如元眼紅絲裏或單或

受氣旁生

註

此證山肺經鬱熱更兼多語損氣而成形如元眼紅絲相裏或單或雙生於喉旁亦有頂大蒂小者不犯不痛或酌酒炙烤或因怒氣喊叫犯之則痛忌用鍼刀宜服益氣清金湯以消痛碧玉散點之即效

益氣清金湯

苦桔梗 三錢

黃芩 二錢

浙貝母

去心研

麥冬 去心

牛蒡子 各一錢五分

人參

白茯苓

陳皮

生梔子

研

薄荷

甘草

各一錢

紫蘇

五分

竹葉三十片水三鍾煎一鍾食遠服渣再煎服

方歌益氣清金肺熱攻注喉成瘤元眼形陳夢苓蘇苦桔貝麥

冬梔薄草參苓

消痛碧玉散

礪砂 三錢

冰片

膽礬 各三分

共研細末用時以飭頭蘸藥貼患處

方歌消痛碧玉點喉瘤開結通喉熱可搜君以礪砂冰片兌膽

礬末入患皆瘳

甘 疳 圖



甘疳生在乳上肉高聳處

胸乳部

甘疽

甘疽憂思氣結成膺生穀粒紫萁形寒熱硬痛宜速潰潰遲須防毒陷攻

註

此證由憂思氣結而成生於膺上即胸膛兩旁肉高處屬

肺經中府穴之下無論左右皆能爲患初如穀粒色青漸若枯萁色紫堅硬疼痛憎寒壯熱速潰稠膿者順若過十日寒熱不退信膿不生脈見浮數防毒內陷攻裏致生惡證局逆初宜服荊防敗毒散以疎解寒熱次服內托黃耆散應期不潰者急服十全大補湯托之其餘內外治法按

疳積場潰瘍門

荆防敗毒散

見頭部
腦宜

內托黃耆散

見背部
中搭手

十全大補湯

見潰瘍門

癰中疽圖



癰中疽生在兩乳中央

癰中疽

腫中疽

腫中疽是粟粒形色紫堅硬漸熾疼七情火毒發任脈急隨證治緩成凶

註

此證生於心窩之上兩乳中央屬任脈經腫中穴由臟腑不和七情不平火毒凝結而成初起如粟色紫堅硬漸生熾熱腫痛憎寒壯熱宜急服仙方活命飲加蘇葉薄荷葉汗之或煩躁作嘔唇焦大渴宜奪命丹清之俟表證已退急服托裏透膿湯若瘡勢不起屬虛宜十全大補湯托之但腫中爲氣滯氣之所居焉施治貴早若遲則毒陷攻裏傷膜透氣者道其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

金匱要略卷之六

三

仙方活命飲 見腫瘍門

奪命丹 見背部陰

托裏透膿湯 見頭部

十全大補湯 見潰瘍門

脾發疽圖



脾發疽生在心窩下兩傍

脾發疽

脾發疽生心下旁炙燂毒酒火爲殃初如粟粒時寒熱漸增腫痛潰膿昌

註

此證生於心窩下兩旁屬脾經食竇穴無論左右俱生之皆由過食炙燂厚味藥酒以致脾經積火成毒而發初起形如粟粒寒熱往來漸增腫痛若頂尖根束紅活鮮潤應即即潰膿者順若頂平根散色紫堅硬屆期不潰既潰膿如餅沫者逆初服劑防敗毒散汗之唇焦大渴煩躁者宜服太乙紫金錠次服內疎黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

太乙紫金錠

一名紫金丹 一名玉樞丹

雄黃

三錢 鮮紅大 鬼者研末

硃砂

三錢 有神 氣者研末

麝香

三錢 揀淨 皮毛研末

川五倍子

二兩 一名文蛤 破研末

紅芽大戟

杭州崇大戟為上 江南土大戟次之 北方綿大戟色白者性烈 峻利 弱人服之反致吐血 慎之勿用 取上品者去盡根洗淨 焙乾為末 一兩五錢

山慈菇

二兩 洗去皮 焙乾研末

千金子

一兩 名續隨子 仁白者去油

以上之藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重陽或

天月德天醫黃道上吉之辰凡入室合藥之人三日前俱

宜齋沐更換新潔衣帽臨日方入室中淨手薰香預設藥

王牌位主人率眾焚香拜禱事畢各將前藥七味稱準入

於大孔鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加糯米濃汁
調和軟硬得中方用杵搗千餘下極至光潤爲度每錠一
錢每服一錠病勢重者連服二錠以取通利後用溫粥補
之修合時除合藥潔淨之人餘皆忌見此藥惟在精誠潔
淨方效

方
太乙紫金諸瘡毒疔腫癰疽皆可除雄硃倍麝千金子紅
大戟山慈菇

一切飲食毒蟲毒瘴氣惡菌河豚中毒自死牛馬猪羊
六畜等類之肉人誤食之必昏亂卒倒或生異形之證並
用水磨灌服或吐或瀉其人必甦

一南方山嵐瘴氣烟霧癘疫最能傷人然之緣也意思不快
惡寒惡熱欲嘔不嘔卽磨一錠服之得吐利便愈

一瘰癧發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛙節紅絲等疔及楊
梅瘡諸風癢疹新久痔瘡並用無灰淡酒磨服外用水磨
塗搽瘡上日夜數次覺瘳而消

一陰陽二毒傷寒心胃狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘟疫
煩亂發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服

一赤白痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸痧及諸痰喘並用薑

湯磨服

一男子婦人急中顛邪時吐奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼魅失心

狂亂羊兒豬頭等風俱用石膏蒲黃湯磨服

一中風中氣口眼歪邪牙關緊急言語蹇澀筋脈攣縮骨節
風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸痛並用酒磨炮熱服之
一自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用
生薑續斷酒煎磨服

一切惡蛇風犬毒蠍蜈蚣諸惡等蟲傷人隨即發腫攻注偏
身甚者毒氣入裏昏悶叫命在須臾俱用酒磨灌下再
吃葱湯一盞蓋被出汗立甦

一新久瘧疾臨發時東流木虱桃柳枝湯磨服

一小兒急慢驚風五疳疔瘡黃腫癰疹瘡疳牙關緊急

並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每錠
分作數服

一牙痛酒磨塗痛上仍含少許良久嚥下

一小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛眼道眼眶損爛者

俱用清水磨塗

一打撲傷損用松節無灰酒研服

一年深月近頭脹頭痛太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣

攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上

一婦人經水不通紅花湯下

一凡遇天行疫證延街闔巷相傳徧染者用桃根湯磨濃滴

入鼻孔次服少許任入病家再不傳染


一又治傳尸勞瘵諸藥不能取效一方士指教服此每早磨服一錠至三次後逐下惡物尸蟲異形怪類後得脫利以此相傳活人不計其數

一一女子久患勞瘵爲尸蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈其濟世衛生之寶藥也

荆防敗毒散 見頭部腦疽

內疎黃連湯 見腫瘍門

井 疽 圖



井疽生在心窩中庭穴

并疽

并疽心火發中庭初如豆粒漸腫疼心躁肌熱唇焦渴紅活易

治黑陷凶

註

此證生於心窩屬任脈中庭穴由心經火毒而成初如豆

粒腫痛漸增心躁如焚肌熱如火自汗聲焦大渴飲冷急

服內疎黃連湯或麥靈丹若煩悶作嘔發熱無汗者奪命

丹汗之如紅活高腫者順黑陷平塌者逆其餘內外治法

俱按癰疽腫瘍潰瘍門若潰後經年不愈者必成穿心冷

癰難治

內疎黃連湯

麥靈丹

俱見腫瘍門

奪命丹

見背部陰陽二氣疽

蜂窩疽圖



蜂窩疽生在乳房之形如蜂房

蜂窩疽

蜂窩疽形似蜂窩胸側乳上瘡孔多漫腫紫痛心火毒黑陷者逆順紅活

註

此證生於胸側乳上亦有遍身而發者由心火毒盛而成色紫漫腫疼痛身發寒熱初起六七孔漸漸延開有三五寸亦有六七寸者形似蜂房卽有數十竅每竅出黃白膿宜腫瘡面全腐腐脫有新肉色紅鮮潤者順若出黑水氣穢平塌者逆始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門遇氣寒之人至八九日不潰以神燈照每日照之應期卽潰

神燈照法

見首卷

蠹

疽

圖



蠹疽生在髓子骨軟陷中

癰疽生於缺盆中初豆漸李堅紫疼寒熱尿澀宜蒜炙證由膽
胃積熱生

註

此證一名缺盆疽又名鎖骨疽生在胸上項下懶子骨內
輒陷中缺盆穴屬膽胃二經積熱而成初發寒熱往來筋
骨拘急飲食不思胸腹膨脹小水短澀初發如豆漸大如
李色紫堅硬疼痛初宜艾壯隔獨頭蒜片灸之內服奪命
丹汗之次服六一散通利小水膿勢將成宜服內托黃耆
散氣血虛甚者宜服十全大補湯托補之其餘內外治法
俱按癰疽腫瘍潰瘍門此證宜急托治若失治腐爛內陷

瘡口難斂必成敗證

六一散

滑石

六兩

甘草

生一兩

共為末每服三錢燈心煎湯調服

方

六一散醫小水瘰能除燥濕熱有功滑石甘草研成末燈

心湯調服立通

奪命丹

見背部陰陽二氣疽


內托黃耆散

見背部中搭手

十金大補湯

見潰瘍門

真癰癰圖



真癰癰生在乳旁

癰癤

癰癤在乳旁生結核紅腫硬焮疼包絡痰凝脾氣鬱治宜溫舒化堅凝

註

此證生於乳旁初腫堅硬形類結核發長緩慢漸增焮腫色紅疼痛由包絡寒痰脾氣鬱結而成係寒證非熱證也治宜溫和舒鬱化堅以內補十宣散服之外敷回陽玉龍膏消之如不消膿勢將成也內外治法即按癰疽腫瘍潰瘍門

內補十宣散

人參

黃耆

當歸各二兩

桔梗

厚朴

薑製

川芎

白芷

肉桂

防風

甘草

各一兩炙

共研末每服三錢熱黃酒調服

不飲酒者木香煎湯調下

方歌內補十宣諸腫毒已成令潰未成消參耆桔朴芎歸草芷

桂防風熱酒調

回陽玉龍膏

見腫瘍門

內外吹乳

吹乳乳毒乳腫疼內吹胎熱痛焮紅外吹子鼻涼氣襲寒熱煩

渴結腫疼

計

乳房屬胃乳頭屬肝而有內吹外吹之分內吹者懷胎六七月胸滿氣上乳房結腫疼痛若色紅者因多熱也不紅者既因氣鬱且兼胎旺也多熱者宜服柴胡清肝湯氣鬱者宜服逍遙散外俱敷冲和膏必消或初腫失於調治或本人復傷氣怒以致大腫大痛其勢必欲成膿宜用逍遙散加黃耆白芷連翹以養血排膿治之膿潰之後宜調養血氣待生產後按潰瘍治法方得收口妊娠用藥禁忌另有歌訣詳載首卷外吹者由乳母肝胃氣濁更兼子吮乳睡熟鼻孔涼氣襲入乳房與熱乳凝結腫痛令人寒熱往

不煩躁口渴初宜服荆防牛蒡湯外用隔蒜灸法俟寒熱退仍腫片服橘葉枳殼散外敷冲和膏消之其腫消之不應片將欲作膿卽用透膿散其餘內服外敷之法俱按癰疽腫瘍潰瘍門又有至如內未懷胎外未行乳而生毒者係皮肉爲患未傷乳房此肝胃濕熱凝結而成乳毒也法當按瘡癰治之無有不效者

荆防牛蒡湯

荆芥

防風

牛蒡子

炒研

金銀花

陳皮

花粉

黃芩

蒲公英

連翹

去心

兒刺 各一錢

柴胡

香附子

什草 各五分

水二鍾煎八分食遠服

方劑防牛蒡乳外吹寒熱腫疼俱可推銀花陳草柴香附花

粉苓蒲翹刺隨

橘葉栝蘂散

橘葉 二十個

栝蘂 量證用半個或一個

川芎

黃芩

梔子 生研

連翹 去心

石膏 煨

柴胡

陳皮

青皮 各一錢

甘草 五分

水二鍾煎八分食後服渣再煎服

紫腫喉痛用石膏紅腫者去之

方歌橘葉枯萸吹乳證涼襲熱乳凝結成芎苓梔草連翹等石

膏柴與陳皮青

柴胡清肝湯

見頭部
鬚疽

逍遙散

見背部
上搭手

中和膏

透膿散

俱見腫
瘍門

隔蒜灸法

見首卷
灸法內

乳

疽

圖

乳
疽



乳癰圖



乳癰

乳疽 乳癰

乳疽乳癰乳房生肝氣鬱結胃火成癰形紅腫焮熱痛疽形木硬覺微疼癰發膿成十四日疽發月餘膿始成未潰托裏排膿治已潰大補養榮靈

註

此證總由肝氣鬱結胃熱壅滯而成男子生者稀少女子生者頗多俱生於乳房紅腫熱痛者爲癰十四日膿成若堅硬木痛者爲疽月餘成膿初起寒熱往來宜服托裏牛勞湯寒熱悉退腫硬不消宜用復元通氣散消之若不應復時時跳動者勢將潰膿宜用托裏透膿湯膿脹痛者鍼之宜服托裏排膿湯虛者補之如人參養榮十全大補等

湯俱可選用外敷貼之藥俱按癰疽腫瘍潰瘍門

栝蒌牛蒡湯

栝蒌仁

牛蒡子

研炒

花粉

黃芩

生梔子

研

連翹

去心

皂刺

金銀花

甘草

生

陳皮

各一錢

青皮

柴胡

各五分

水二鍾煎八分入煮酒一杯和勻食遠服

方歌栝蒌牛蒡胃火鬱憎寒壯熱乳癰疽青柴花粉芩翹刺銀

花梔子草陳皮

復元通氣散

見腫瘍門

從多... 金鑑

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

托裏排膿湯

見頂部
魚尾毒

人參養榮湯

十全大補湯

俱見潰瘍門

乳發 乳漏

乳發如癰胃火成男女皆生赤腫疼潰久不斂方成漏只爲膿

清肌不生

註

此證發於乳房焮赤腫痛其勢更大如癰皮肉盡腐山胃

滯濕火相凝而成治法急按乳癰未成形者消之已成形

若托之腐脫遲者黃靈藥散之以免偏潰乳房致傷囊桶

難以收斂若久不收口外寒侵襲失於調養時流清水者
卽成乳漏外用紅升丹作撚以去腐生肌再兼用豆豉餅
灸法緩緩灸之以怯寒內當大補氣血節勞煩慎起居忌
發物漸可生飢斂口而愈

黃靈藥

紅升丹

俱見潰瘍門

豆豉餅

見首卷
灸法內

乳中結核

乳中結核梅李形按之不移色不紅時時隱痛勞岩漸證由肝
脾鬱結成

計

此證乳房結核堅硬小者如梅大者如李按之不移推之不動時時隱痛皮色如常由肝脾二經氣鬱結滯而成形勢雖小不可輕忽若耽延日久不消輕成乳勞重成乳岩慎之慎之初起氣實者宜服清肝解鬱湯氣虛宜服香貝養榮湯若鬱結傷脾食少不寐者服歸脾湯外俱用木香餅熨法消之甚效

清肝解鬱湯

當歸

生地

白芍

酒炒

川芎

陳皮

半夏

各八分製

貝母

去心研

茯神

青皮

遠志

去心

桔梗

蘇葉

各六分

梔子

生研

木通

甘草

各四分

香附

一錢醋炒

水二鍾薑一片煎八分食遠服

方歌

清肝解鬱貝茯神四物青皮遠夏陳梔桔通蘇香附草能

消乳核氣鬱伸

歸脾湯

人參

白朮

土炒

棗仁

炒研

龍眼肉

茯神

各二錢

黃耆

一錢五分

當歸

一錢酒洗

遠志

去心

木香

末

甘草

炙 各五分

生薑三片紅棗肉二枚水煎服

方歌

歸脾湯治脾胃怯食少怔忡夜不安棗遠龍眼參歸草茯

神耆木木香煎

木香餅

生地黄

一兩 研爛

木香

五錢 研末

共和勻量結核大小和餅貼腫上以熱熨斗間日熨之堅

硬木痛者每日熨之

方歌

木香餅消乳核方舒通結滯功倍強生地研爛木香末和

餅貼患處之良

香貝養榮湯

見頭部
上石疽

乳勞

乳勞初核漸腫堅根形散漫大如盤未潰先腐微斑點敗膿津久勞證添

註

此證卽由乳中結核而成或消之不應或失於調治耽延數月漸大如盤如盃堅硬疼痛根形散漫出延胸肋腋下其色或紫或黑未潰先腐外皮微點爛斑數處漸漸通破輕津白汁重流臭水卽敗漿膿也日久潰深傷膜內病漸添午後煩熱乾嗽額紅形瘦食少陰虛等證俱見變成瘡勞初結腫時氣實者宜服萆貝散及神效栝瓠散氣虛者

逍遙散及歸脾湯合而用之陰虛之證已見宜服六味地黃湯以培其本外治法按癰疽潰瘍門然此瘡成勞至易獲效甚難

獲貝散

栝蒌

貝母

去心研

南星

甘草

生

連翹

各一錢
去心

水二鍾煎八分澄渣加酒二分食遠服

一加青皮升麻

方歌

獲貝散治乳結核漸大失調變乳勞初腫氣實須服此南

星甘草共連翹

神效枯藁散

大橘葉

一個去皮焙為末

當歸

甘草

各五錢生

沒藥

乳香

各二錢

共研粗末每用五錢醇酒三鍾慢火熬至一鍾去渣食後

服之

方歌神效枯藁沒乳香甘草當歸研末良乳勞初腫酒煎服消

堅和血是神方

逍遙散

見背部上搭手

歸脾湯

見乳中結核

六味地黃湯

即六味地黃丸改作煎劑見面部雀斑

石象山志卷之二

乳岩

乳岩初結核隱疼肝脾兩損氣鬱凝核無紅熱身寒熱連灸養血免患攻耽延續發如堆栗堅硬岩形引腋胸頂透紫光先腐爛時流污水日增疼潰後翻花怒出血卽成敗證藥不靈

註

此證由肝脾兩傷氣鬱凝結而成自乳中結核起初如棗栗漸如棋子無紅無熱有時隱痛速宜外用炙法內服養血之劑以免內攻若年深日久卽潮熱惡寒始覺大痛牽引胸腋腫如覆盃堅硬形如堆栗高凸如岩頂透紫色光亮肉含血絲先腐後潰污水時津有時湧冒臭血腐爛深如岩壑翻花突如泛蓮疼痛連心若復因急怒暴流鮮血

根腫愈堅期時五臟俱衰卽成敗證百無一救若患甚果
能清心滌慮靜養調理庶可施治初宜服神效枯葉散次
宜清用解鬱湯外貼季芝鯽魚膏其核或可望消若反復
不應者瘡勢已成不可過用剋伐峻劑致損胃氣卽用香
貝養榮湯或心煩不寐者宜服歸脾湯潮熱惡寒者宜服
逍遙散稍可苟延歲月如得此證者於腫核初起卽加醫
治宜用豆粒大艾壯當頂灸七壯次日起炮挑破用三稜
鍼刺入五六分插入冰螺散搨子外用紙封糊至十餘日
其核自落外貼降珠膏生肌玉紅膏內服舒肝養血理脾
之劑生肌斂口自愈

季芝鯽魚膏

活鯽魚肉

鮮山藥

各等分
去皮

右共搗如泥加麝香少許塗核上覺癢極勿搔動隔衣輕

方歌

鯽魚膏貼乳岩疾腫如覆盂似堆栗山藥同研加麝香塗

於患處七日易

冰螺撚

礪砂 二分

大田螺

五枚去殼
線穿晒乾

冰片

一分

白砒

即人言一錢二分麪裏
煨熟去麪用砒

將螺肉切片同白砒研末再加礪片同煨細以稠米糊搓

成燃子磁礮密收用時將燃插入鍼孔外用紙糊封貼核上勿動十日後四邊裂縫其核自落

方歌冰螺燃消諸核癰礮砂螺肉煨白礮再加冰片米糊燃乳

岩堅硬用之宜

神效栝瓊散 見乳勞

香貝養榮湯 見項部上石瘡

清肝解鬱湯

歸脾湯 俱見乳中結核

逍遙散 見背部上搭手

絳珠膏

生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

御纂醫宗金鑑卷六十七

編輯外科心法要訣目錄

腹部

幽癰

中脘疽

嚇癰

衝疽

臍癰

附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

黯疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇癰
附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

御纂醫宗金鑑卷六十七

編輯外科心法要訣

幽 癰 圖

幽癰在臍上七寸



名醫集解卷之二十七
腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂思厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻

註

此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鶩卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒白內而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦脈沉實者當疎火毒以絕其源宜內疎黃連湯服之癰腫痛甚邪氣實也宜服托裏散外用艾壯隔蒜片灸之脈見沉遲其膿未成用補中益氣湯托之膿見洪數其膿

已成用托裏透膿湯熱脹痛不潰係氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用卧鍼開卧鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒涼以致腫而不潰潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少作瀉脾胃虛也胸痞痰涌脾肺虛也俱服六君子湯服後諸證悉退換十全大補湯調理卽愈外治之法按癰疽腫瘍潰瘍門無論已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蠟吐沫者係內膜已透俱爲逆證

托裏散

皂刺

金銀花

黃芩

牡蠣

煨

當歸

赤芍

朴消

大黃

花粉

連翹

各等分
去心

共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去渣服

方歌

托裏散醫諸瘡毒腫甚炊疼煎服消皂刺銀花芩牡蠣歸

芍消黃花粉翹

內疎黃連湯

見腫瘍門

隔蒜灸法

見首部灸法

托裏透膿湯

見頭部
侵腦症

補中益氣湯

十全大補湯

六君子湯

即香砂六君子湯減去
藿香砂仁俱見瀆瘍門

中脘疽圖

中脘疽在臍上四寸



中脘疽

中脘疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔
蟻毒內攻

註此證一名胃疽發於心胸之下臍上四寸任脈經中脘穴
隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙
煇以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作嘔不食
咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲
內消散膿勢將成內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若起
長膿遲或瘡不炊痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸
之回陽

山甲內消散

穿山甲 三大片

當歸尾

大黃

甘草節 各三錢

土木鱉 三個

黑牽牛

殭蠶 各一錢

酒水各一鍾煎八分空心服渣再煎服大便行三四次方

食稀粥淡味調理

方歌 山甲內消火毒積色紫堅疼中腕疽歸尾大黃殭草節木

鱉牽牛加酒宜

仙方活命飲 見腫瘍門

圖

癰

腫



癰腫生在臍上三寸

癰癤

癰癤七情鬱火成臍上三寸粟微紅暴腫焮痛二七潰頂陷色黑潰遲凶

註

此證由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬任脈經建里穴初如粟米癢痛相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍痛初腫微紅頂尖根束漸透赤色時痛時止十四日潰膿者順若頂陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見浮數而散大者逆內治與幽癰參考外治法按癰疽腫瘍潰瘍門

衝疽圖



衝疽在臍上二寸

衝疽

衝疽臍上二寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛速潰言若見七惡定然凶

註

此證生於任脈臍上二寸下脘穴一名中發疽又名壅腎瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二十一日潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消之膿將成時內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門其證若平塌紫黑膿水清稀七惡證見者逆

瘡科流氣飲

見背部痰注發

仙方活命飲

見腫瘍門

癰 癰 圖

癰癰生在肚臍



臍癰

附臍中出水

臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅無熱宜蒜灸稠膿爲

吉污水凶

註

此證由心經火毒流入大腸小腸所致生於臍中屬任脈
經神闕穴此穴禁鍼腫大如瓜高突若鈴無紅無熱最宜
隔蒜灸之初宜服仙方活命飲加升麻消之便結實者內
疎黃連湯通利之將欲成膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰
瘍門潰後得稠膿者順時出污水臭穢者逆亦有臍中不
痛不腫甚癢時津黃水此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平
胃散外用三妙散乾撒溼即愈當忌酒麪生冷果菜不

致再發若水出不止者亦屬逆

黃連平胃散

黃連

五錢

陳皮

厚朴

各三錢
薑炒

甘草

二錢
生

蒼朮

一兩
炒

共研細末每服三錢白滾水調服

方歌黃連平胃散陳甘厚朴蒼朮共細研專除濕熱兼消積能

令臍水立時乾

三妙散

檳榔

蒼朮

生

黃蘗

各等分
生

共研細末乾撒肚臍出水津淫成片止癢滲濕又治濕癬

以蘇合油調搽甚效

歌方三妙散用栴榔蒼黃藥同研溲濕瘡蘇合油調治濕癬收

乾止癢效稱強

隔蒜灸法 見首卷灸法

仙方活命飲

內疎黃連湯 俱見腫瘍門

少腹疽圖

少腹疽



少腹疽

少腹疽生臍下邊證由七情火鬱纏高腫紅疼牽背易漫硬陷腐水膿難

註

此證由七情火鬱而生每發於氣海丹田關元三穴氣海在臍下一寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下三寸皆屬任脈經此三穴或一穴發腫卽爲少腹疽高腫紅活疼痛牽背易潰稠膿者易治若漫腫堅硬綿潰腐爛膿稀如水者難治凡遇此證初起急用艾灸腫頂七壯至三七壯以痛癢通徹爲度宜服仙方活命飲氣實之人太渴便秘者宜服內疎黃連湯並列之老弱之人宜服內補十宣散

令其速潰若潰遲恐透內膜外治法同癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲

內疎黃連湯

俱見腫瘍門

內補十宣散

見胸部
癰癰癰

腹皮癰圖

腹皮癰左右皆同



腹皮癰

腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱疼腹痛不止膿成候證由腎
梁鬱火生

註

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼日久後發癰腫於
皮外右關脈見沉數而腹痛甚者是其候也由腎梁火鬱
而成初起壯實者用雙解貫金丸下之虛弱者減半用之
不應再服半劑凡下之後腹痛不止膿將成也急用托裏
透膿湯潰後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用剋伐之
劑若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危
亡矣

御製醫宗金鑑卷之二十一

雙解貴金丸

見肺腸門

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疔

經道圖



緩道在少腹之旁

緩疽

緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅又疼數月不潰生寒熱食少削瘦效難成

此證由太陰脾經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅硬如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者終屬敗證不可棄而不治初宜服山甲內消散不應不消強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡盧巴溫補之外用木香餅熨之兼用獨頭蒜搗爛鋪於患上文壯灸之以知熱為止次日再灸以或消或潰爲效若潰後卽按癰疽潰瘍門治法

山甲內消散

見中腕疽

十全大補湯

見潰瘍門

木香餅

見乳部乳中結核

腋癰圖



腋癰生在肋腋窩居中左右皆同

腋部

腋癰

腋癰暴腫生腋間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼忿怒初宜清解潰補痊

註

此證一名夾肢癰發於腋際卽俗名肱肢窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散加金銀花甘草節桔梗膿脹痛者鍼之已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾忌用寒涼中年易愈老弱之人難痊

柴胡清肝湯

見頭部
鬚疽

中和膏


透膿散

俱見腫
痛門

圖

疽

腋



腋疽生在肘腋窩居
甲乙癰疽雖左右臂同

腋疽

腋疽初起若核形肝悲脾憂氣血凝漫腫堅硬宜蒜灸日久紅熱潰先疼

註

此證一名米疽又名灸疽發於肱腋窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思悲怒氣結血滯而成漫腫堅硬皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛也初宜艾壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯加烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏敷之早治或有全消者遲則膿成宜服托裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門此證初終內外治法

禁用寒涼中年易愈衰老難痊

隔蒜灸法

見首卷灸法

柴胡清肝湯

見頭部鬢疽

香貝養榮湯

見頭部上石疽

烏龍膏

見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

癰

疔

圖



癰疽生在肘腋窩堅硬色紫按之如釘頭

黯疔

黯疔藏於腋下生肝脾火毒癰而疼寒熱拘急色紫黑急按疔門治卽寧

註

此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬勢若釘頭癢而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩躁作嘔痛引半身宜服麥靈丹其次內外急按疔門治之卽愈

麥靈丹

見腫瘍門

肋

疽

圖



肋疽在肋條骨間堅硬色紫腫大如盤

肋部

肋疽

肋疽始發屬肝經火毒鬱怒結腫形紫痛梅毒李甚如盤急宜鍼砭免內攻

註

此證一名夾熒疽生於肋條骨間由肝經火毒鬱怒結聚而成初如梅毒漸大如盤色紫焮痛連及肩肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十一日之內膿潰稠黏者順屆期不潰既潰出清水者逆初腫急宜磁鍼砭出紫血庶免毒氣攻裏砭後赤腫痛甚煩躁脈實作嘔爲有餘之證宜服雙解貴金丸下之腫硬不潰宜服透膿散脈弱作嘔

此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者卽同胃虛治之若感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助氣爲主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用臥鍼開之餘按癰疽潰瘍門治法

雙解貴金丸

透膿散

俱見腫瘍門

香砂六君子湯

見潰瘍門

淵 疽 圖



淵疽在腋下手堅硬不紅

淵疽

淵疽肝膽憂恚成生於肋下硬腫疼潰破有聲內膜透未潰當服護膜靈

註

此證因憂恚太過以致肝膽兩傷而成生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也卽於陽陵泉灸灸二七壯其聲卽止穴在膝膕骨外廉下一寸陷中蹲坐取之卽得內外治法皆同肋疽凡肋膕脅腰腹空輒之處發癰疽者當在將潰未潰之際多服護膜散可免透膜之患

護膜散

白蠟

白及 各等分

共研細末輕劑一錢中劑二錢大劑三錢黃酒調服米湯亦可

方歌 護膜散內二味藥白蠟白及爲細末或酒或以米湯調將

膿預服不透膜

石象鼻金

內發丹毒圖



內發丹毒生於肋骨延及腰脇色赤如膏遊走如雲

內發丹毒

丹毒肝脾熱極生肋上腰膀赤霞形急宜砭出紫黑血嘔噦昏
脹毒內攻

註

此證由肝脾二經熱極生風所致生於肋骨延及腰膀色
赤如霞遊走如雲痛如火燎急向赤腫週圓砭出紫黑血
以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可其毒即可減半初服雙解
貴金丸汗之次服化斑解毒湯投方應病者願若嘔噦昏
憤胸腹臃脹遍身青紫者則爲毒氣內攻屬逆

化斑解毒湯

升麻

石膏

連翹

去心

金匱要略卷之二十一

牛蒡子

炒研

人中黃

黃連

知母

黑參 各一錢

竹葉二十片水二鍾煎八分服

方化斑 解毒熱生風致發丹毒雲片紅升膏翹勞中黃等黃

連知母照參同

雙解貴金丸

見腫瘍門

圖

癰

脇



脇癰在肋骨下軟肉處

脇癰附疽

脇癰焮紅高腫疼疽堅塌漫冷不紅皆屬肝膽怒火結遲潰敗
漿冷虛凶

此證生於輭肋有硬骨者爲肋肋下輭肉處爲季脇癰疽
二證皆由肝膽怒火凝結而成多生於體虛之人初如梅
李漸長如盃如盆色紅焮痛高腫二七潰破膿稠爲癰若
堅硬平塌漫腫木痛不紅不熱月餘潰破稀膿爲疽若失
治屆期不潰攻擊成膿腫如鼓脹破出敗漿腥臭膿者逆
癰疽二證初腫時俱宜急服柴胡清肝湯解鬱瀉火如已
成者服托裏透膿湯膿熟脹痛俱用臥鍼開之已潰以排

餘膿補氣血爲要餘按癰疽潰瘍門治法投補不應者難

治


柴胡清肝湯

見頭部
鬚疽

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

五臟六腑



心募巨闕穴

胃募中脘穴


大腸募天樞穴

三焦募石門穴

膀胱募中極穴

小腸募關元穴

圖 穴 募 諸



內癰部

肺癰

肺癰肺熱復傷風肺臟生癰隱痛胸狀若傷寒燥欬甚稠濁痰涎腥臭膿未潰射干麻黃汗壅不得卧葶藶攻潰後膿稠能食古膿清兼血不食凶

註

此證係肺藏蓄熱復傷風邪鬱久成癰以致胸內中府穴隱隱疼痛振寒蠅數狀類傷寒咽燥不渴欬而喘滿唾稠黏黃痰兼臭穢膿血也治之者於未潰時乘膿未成風鬱於表者法宜疎散用射干麻黃湯以汗之如氣壅喘滿身不得臥者急服葶藶大棗湯以瀉之如欬有微熱煩滿胸

中甲錯膿欲成者宜千金葦莖湯以吐之若吐膿腥臭形
如米粥者宜桔梗湯以排餘膿若吐膿腥臭欬而胸滿者
宜外臺桔梗白散以開痰塞若咯吐膿血兼午後身熱煩
躁宜金鯉湯主之兼飲童便若潰後胸膈脇肋隱痛不止
口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠卧不得欬吐稠痰腥臭
此係癰膿不盡而兼裏虛宜寧肺桔梗湯主之若癰膿已
潰喘滿腥臭濁痰俱退惟欬咽乾咯吐痰血脇肋微痛
不能久臥者此屬肺癰潰處未斂宜紫苑茸湯清補之渴
甚去半夏加石膏服之若癰膿潰後欬嗽無休膿痰不盡
形氣虛羸者宜清金寧肺丸主之凡治此證惟以身溫脈

細膿血交粘痰色鮮明飲食甘美膿血漸止便潤者為去
若手掌皮粗潰後六脈洪數氣急額紅汚膿白血懶食及
大便結燥者為凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨
間

射干麻黃湯

射干

十三枚
或三兩

麻黃

生薑

各四兩

細辛

紫苑

款冬花

各三兩

大棗

七枚

五味子

半夏

各半升
洗

水煎溫服

方歌射干麻黃欬上氣肺癰喉中水雞聲射麻生薑辛苑夏五

味大棗並欬冬

葶藶大棗湯

苦葶藶

輕者五錢重者一兩

大棗

輕者五枚重者十枚去核

以上水三鍾煎至一鍾服之

方歌葶藶大棗治肺壅欬不得卧有癰膿葶藶苦寒瀉實熱佐

棗之甘和胃經

千金葶藶湯

葶藶

二升

薏苡仁

炒

瓜瓣

各半升即冬瓜仁

桃仁

五十粒去皮尖炒研

水煎服

方歌千金葶苈肺癰欬微熱煩滿吐敗濁皮膚甲錯宜葶苈

苈桃仁瓜瓣合

桔梗湯

苦桔梗 一兩

甘草 二兩生

水煎服

方歌桔梗湯用排餘膿肺癰吐膿米粥形清熱解毒須甘草開

提肺氣桔梗功

外臺桔梗白散

苦桔梗

貝母 各三分

巴豆 一分

去皮熬研如脂

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐

膿在膈下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定

方歌外臺桔梗白散方肺癰便秘服之良桔梗貝母與巴豆藥

微力大功速強

金鯉湯

金色活鯉魚

一尾約四兩重

貝母二錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻在魚肚內線紫之用上白童子便半大盃將魚浸童便內重湯炖養魚眼突出爲度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內炖熟肉與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

方歌

金鯉湯中效罕稀法同貝母活鯉魚童便浸魚重湯炖肺

雜錄醫方卷之二十一

癰煩熱善能醫

寧肺桔梗湯

苦桔梗

貝母

去心

當歸

栝蒌仁

研

生黃耆

枳殼

炙炒

甘草節

桑白皮

炒

防已

百合

去心

薏苡

炒各八分

五味子

地骨皮

知母

生

杏仁

炒研

苦葶藶

各五分

水二鍾薑三片煎八分不拘時服

欬甚倍加百合

身熱加柴胡黃芩

大便不利加蜜炙大黃一錢

小水澀滯加燈心木通

煩躁痰血加白茅根

胸痛加人參白芷

方歌寧肺桔梗肺癰者歸蓰貝殼甘桑皮防已百合葶五味杏

知苡仁地骨宜

紫苑茸湯

紫苑茸

犀角

末

甘草

炙

人參

各五分

桑葉

用經霜者

欬冬花

百合 去心

杏仁 炒研

阿膠 便清炒用 便燥生用

貝母 去心

半夏 製

蒲黃 生 各七分

引薑三片水二鍾煎八分將犀角末調入食後服

方歌紫苑茸湯參犀角欵冬桑葉杏百合阿膠甘夏貝蒲黃專

醫肺癰不久卧

清金寧肺丸

陳皮 白茯苓

苦桔梗

貝母 去心

人參

黃芩 各五錢

麥冬 去心

地骨皮

銀柴胡

川芎

白芍 炒

胡黃連 各六錢

五味子

天冬

去心

生地

酒浸搗膏

熟地

搗膏

歸身

白朮

炒各一兩

甘草

炙三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七十丸食遠白滾

湯送下

方歌濟金寧肺丸肺癰陳苓桔貝參二冬柴芩歸芍黃連草木

味生熟地黃骨芍

大小腸癰

大小腸癰因濕熱氣滯瘀血注腸中初服大黃行瘀滯膿成意

薏牡丹平

註

此二證俱由濕熱氣滯凝結而成或努力瘀血或產後敗瘀蓄積流注於大腸小腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛大腸癰多大便墜腫小腸癰多小水澀滯脈俱遲緊此時癰膿未成宜大黃湯下之瘀血利盡若小水閉澀仍宜大黃湯加琥珀末木通利之自效若癰成日久不潰身皮甲錯內無積聚腹急腹痛身無熱而脈數者係腸內陰冷不能爲膿宜薤白附子散主之若脈見洪數肚臍高突腹痛脹滿不食動轉側身則有水聲便淋刺痛者癰膿已成宜薤白湯主之腹濡而痛少腹急脹時時下膿者毒未解也宜升皮湯

治之如膿從臍出腹脹不除飲食減少面白神勞此屬氣血俱虛宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子歛而補之患者轉身動作宜徐緩而勿驚慎之如耽延日久因循失治以致毒攻內藏腹痛牽陰腸胃受傷或致陰器紫黑腐爛色敗無膿每流污水衾幃多臭煩躁不止身熱盜汗俱屬逆證關元穴又名小腸募在臍下三寸天樞穴又名大腸募在臍旁開二寸

大黃湯

大黃

剉炒

牡丹皮

消石

研

芥子

桃仁

炒先以湯浸去皮尖雙仁勿用

右各等分共剉碎每用五錢水二鍾煎至一鍾去渣空心

溫服以利下膿血為度未利再服

方歌 大黃湯善治腸癰少腹堅痛膿未成牡丹皮與大黃炒芥

子桃仁消石靈

薏苡附子散

附子 二分

敗醬 五分

薏苡仁 一錢

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小水當下三因云

薏苡附子同前敗醬用一兩一分每四錢水盞半煎七分

去渣空心服

方歌 薏苡附子散用錯腸癰腹脹痛脈數附子敗醬薏苡仁為

末水煎空心服

薏苡湯

薏苡仁

栝蒌仁 各三錢

牡丹皮

桃仁 各二錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服

方歌 薏苡湯治腹水聲腸癰便淋刺痛疼牡丹皮共栝蒌子還

有桃仁薏苡仁

丹皮湯

丹皮

栝蒌仁 各一錢

桃仁 泥

朴消 各二錢

大黃 五錢

水二鍾煎一鍾去渣入消再煎數滾不拘時服

方歌丹皮湯療腸癰證腹濡而痛時下膿消黃丹萸桃仁共水

煎服之有奇功

八珍湯 見潰瘍門

胃癰

胃癰中脘穴腫疼不欬不嘔吐血膿飲食之毒七情火候治腸

癰大法同

註

此證初起中脘穴必隱痛微腫寒熱如瘧身皮甲錯並無

咳嗽咯吐膿血由飲食之毒七情之火熱聚胃口成癰脈

來沉數者初服清胃射干湯下之若脈瀯滯者瘀血也宜

服丹皮湯下之。脈洪數者，膿成也。赤豆薏苡仁湯排之。體倦氣喘作渴，小水頻數者，肺氣虛也。補中益氣湯加麥冬、五味子補之。其候證生死治法與大小腸癰同。中脘穴又名胃募，在臍上四寸。

清胃射干湯

射干

升麻

犀角

麥冬

去心

元參

大黃

黃芩

各一錢

芒消

梔子

竹葉

各五錢

水煎服

方歌 清胃射干湯射干升麻犀角麥冬全參苓大黃芒消等竹

葉山梔胃癰痊

赤豆薏苡仁湯

赤小豆

薏苡仁

防己

甘草 各等分

水二鍾煎八分食遠服

方歌 赤豆薏苡湯最神甘已赤豆薏苡仁胃癰膿成膿洪數二

鍾水煎服八分

丹皮湯 見大小腸癰

補中益氣湯 見潰瘍門

脾癰

脾癰濕熱瘀血凝章門穴腫兼隱疼腹脹噎乾小水短利下濕
瘀補收功

註

此證始發章門穴必隱疼微腫由過食生冷兼濕熱或瘀
血鬱滯脾經而成令人腹脹咽噎乾燥小水短澀初宜大
黃湯赤豆薏苡仁湯二方合而用之以攻滯鬱二便通利
腹脹全消宜六君子湯扶脾調理順逆看法與胃癰同章
門穴又名脾募在臍旁開六寸高上二寸

大黃湯

見大小腸癰

赤豆薏苡仁湯

見胃癰

名身醫分全錄卷之十一
六君子湯

即香砂六君子湯去藿香砂仁
見潰瘍門

肝癰

肝癰憤鬱氣逆成期門穴腫更兼疼卧驚眩滿溺不利清肝滋
腎即成功

註

此證始發期門穴必隱痛微腫令人兩脇脹滿脇痛側卧
則驚便溺艱難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服
柴胡清肝湯痛脹已止宜服六味地黃丸脾虛食少則佐
以八珍湯滋腎補脾治之取效禁用溫補鍼灸期門穴又
名肝募在乳旁一寸半再直上一寸半

復元通氣散

見腫瘍門

柴胡清肝湯

見頭部贅瘤

六味地黃丸

見面部雀斑

八珍湯

見潰瘍門

心癰

心癰巨關腫隱疼酷飲嗜熱火毒成面赤口渴身作痛治法陽

熱總宜清

註

此證始發巨關穴必隱痛微腫令人寒熱身痛頭面色赤

口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼酷飲嗜熱而成宜服涼

血飲酒毒為病者宜服升麻葛根湯治之此證甚屬罕有

但治法不可不備巨關穴又名心募在臍上六寸五分

涼血飲

木通

瞿麥

荆芥

薄荷

白芷

花粉

甘草

赤芍

麥冬

去心

生地

山梔子

車前子

連翹

各等分
去心

引用燈心若潮熱加淡竹葉水煎溫服

方歌涼血飲善治心癰瞿荊荷芷草翹通赤芍山梔乾生地車

前花粉麥門冬

升麻葛根湯

山梔

升麻

葛根

白芍

柴胡

黃芩

各一錢

黃連

木通

甘草

各五分

水二鍾煎八分不拘時服

方歌升麻葛根湯山梔酒毒心癰黃連宜柴芍遙芩升葛草水

煎溫服不拘時

腎癰

腎癰腎經不足生京門微腫隱隱疼少腹肋下臙脹滿房勞形

寒邪外乘

註此證始發京門穴必隱痛微腫令人寒熱往來面白不渴

少腹及肋下臍脹塞滿由腎虛不足之人房勞太過身形受寒邪氣自外乘之初服五積散加細辛寒盡痛止宜用桂附地黃丸調理京門穴又名腎募在身側腰中監骨下肋間

五積散

蒼朮二錢炒

陳皮

桔梗

川芎

當歸

白芍各一錢

麻黃

枳殼麩炒

桂心

乾薑

厚朴各八分

白芷

半夏

製

甘草生

茯苓各四分

引薑一片水二鍾煎八分不拘時服

頭痛惡寒者加連翹葱頭三個蓋卧汗出甚效

方歌

五積散蒼殼陳苓麻黃半桔歸芍芎芷朴桂心乾薑草腎

癰寒邪服成功

桂附地黃湯

見潰瘍門

三焦癰

三焦癰由濕熱凝石門穴上腫隱疼寒結治同腸癰法內癰俱係膜內生

註

此證始發石門穴必隱疼微腫令人寒熱往來二便秘澀由濕熱遇寒凝結而成治法與大小腸癰同凡內癰俱係

膜內成患外皮不腐石門穴又名三焦募在臍下二寸

內癰總論

凡人胸腹有十一募募者各藏府陰會之所也靈樞云發內癰
內疽者其本經募上肉必浮腫募中必時時隱痛浮腫爲癰隱
痛爲疽此卽內癰內疽之驗也茲內癰有治法內疽無治法何
也蓋內癰內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺爲癰
根深爲疽若臨證用藥攻補得宜無不收效至募有十一而內
癰僅九證者何也蓋臍府形如膜皮無出無納汗清氣潔不生
內癰內疽若夫膀胱亦如膜皮中惟濁水故古今書籍並無講
及內癰內疽者是以未敢詳載雖然中極穴卽膀胱募也今人

間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證候竟同小腸癰治法亦
當按小腸癰治之可也俟後之學者留意焉


驗內癰法

凡遇生內癰之人與生黃豆五粒嚼之口中無豆味者是其候
也

從名錄附片金鑑

卷二十一

三



G618
1740
v. 4

